

AVERTISSEMENTS 9-9-07030762 AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Terre

Pomme de 1

-h-i---- -840 du 44 ivillet 2006 - 2 ---

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n°12 du 11 juillet 2006 - 2 pages

Mildiou

Les pluies de la semaine dernière ont engendrées de nouvelles contaminations à l'exception du secteur de Nemours (77).

Quelques soit les parcelles, maintenez les protections.

Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX

Stations	météo SRPV -	FREDON - donn	ées au 11 juillet	
Postes	Génération en cours	Date des demières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies (mm) depuis le 04/07
77-Chevry Cossigny	9	5 et 7 au 8/07	12/07	25
77-Villeroy	8	5 et 7au 9/07	12/07	55.5
78-Boissy Sans Avoir	8	4 et 7 au 9/07	11/07	39.5
78-Poissy	7	8 au 10/07	14/07	1.5
91-Abbeville la Rivière	8	7/07	14/07	4

Stat	tions météo Fr	ance – données a	u 9 juilllet	
Postes	Génération en cours	Date des demières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies (mm) depuis le 01/07
77-Changis sur Marne	6	8/07	14/07	47.4
77-Chevru	8	6 au 8/07	13/07	6
77-La Brosse Montceaux	6	7/07	14/07	16.5
77-Nangis	8	6 et 7/07	14/07	5.2
77-Nemours	Pas	de nouvelles conta	minations	1.6
78-Trappes	6	8/07	14/07	4.6
91-Courdinanche	7	7/07	13/07	12.4
95-Cormeilles	8	7 et 8/07	14/07	14
95-Wy dit joli village	8	7 et 8/08	14/07	17.9

I

Ravageurs

Tarres - Egaled - Protection REPUBLIQUE PRANÇANSE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÉCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE 10 rue du séminaire 94516 RUNGIS cedex Tél: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant : B. FERREIRA

Pucerons

La présence de pucerons est toujours variable d'un secteur à un autre. Seule une parcelle observée à Auvers sur Oise (95) atteint le seuil de 50% de foliole porteuses de pucerons.

Nouvelle méthode pour déclencher son traitement insecticide puceron : Prélever une des deux folioles latérales jouxtant la foliole terminale.

Observer la présence de pucerons ou non et répéter l'opération 40 fois sur différentes plantes.

Intervenez si plus de 20 folioles sur 40 sont porteuses de pucerons.

	nbre de folioles avec puceron/ 40 folioles observées
77-Chambry	2
77-Jouy le châtel	0
77-Lumigny	4
77-Nangis	9
77-Villenauxe la petite	7
95-Auvers sur oise	25
95-Livilliers	10

Rectificatif au tableau insecticide: la dose homologuée du TEPPEKI est 0,16 kg/ha et non 0,14 kg/ha.

Doryphores

De nombreuses parcelles comptabilisent une population importante de larves de doryphores.

Observez vos parcelles et intervenez en présence de larves de doryphores au stade grain de blé avec des pyréthrinoïdes, ou de l'azimphos méthyl (GUSATHION XL).

Pour les traitements insecticides, un volume d'eau important (300 à 400 l eau / ha) est recommandé pour une bonne efficacité.

	% de plantes porteurs			
	œufs	larves	adultes	
77-Chambry	0%	100%	15%	
77-Jouy le châtel	0%	0%	0%	
77-Lumigny	0%	0%	0%	
77-Nangis	0%	50%	0%	
77-Villenauxe la petite	0%	35%	0%	
91-Méréville	0%	10%	0%	
95-Auvers sur oise	0	15%	0	
95-Livilliers	0	15%	0	